



Osmocote[®] Bloom

奥绿[®]草花型 (2-3月)

在草花植物上投入少，长得好。

12 | 7 | 18 | TE
N P₂O₅ K₂O



成分分析

氧化物		
N	总氮	12%
	硝态氮(N-NO ₃)	5.3%
	铵态氮(N-NH ₄)	6.7%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	7%
	水溶(P ₂ O ₅)	5.2%
K ₂ O	氧化钾	18%
	水溶 (K ₂ O)	18.0%
B	硼	0.01%
	水溶(B)	0.01%
Cu	铜	0.045%
	水溶(Cu)	0.027%
Fe	铁	0.35%
	螯合铁(EDTA-Fe)	0.07%
Mn	锰	0.05%
Mo	钼	0.017%
	水溶(Mo)	0.012%
Zn	锌	0.013%

描述

使用奥绿[®]草花型包膜控释肥料，让草花植物焕发新生机。该肥料专为小盆栽植物设计，含有特殊定制配方。不仅是低投入的产品，更是安全、可靠的超值选择。

优势

- \\ 氮磷钾比例为 2: 1: 3，紧凑型草花植物的理想选择
- \\ 直接使用，无需额外添加水溶性肥料
- \\ 延长草花植物的货架期，增加收益

使用方法

- 1 奥绿®草花型拥有独特的树脂包膜技术，能够为草花植物提供均匀稳定的营养释放。
- 2 该产品适用于生长周期为6周-3个月的草花植物。
- 3 对于其他生长周期的草花植物，请选用精准奥绿®高钾型（3-4月）或（5-6月）产品。
- 4 奥绿®草花型的肥效期受温度的影响（基准温度为21°C）：温度越高，肥效期越短。16°C时肥效期为3-4个月，21°C时为2-3个月，26°C时为1.5-2个月。
- 5 密封好已开封或破损的肥料袋。
- 6 请储存于干燥环境。
- 7 如需了解更多信息，请联系技术支持人员。

施用率

	轻度用量	正常用量	重度用量
草花植物/一年生植物	1.5-2克/升	2-3克/升	3-4.5克/升

注意：上述推荐用量是基于基质不含肥料的情况。如果栽培基质不含启动肥，效果更好。但如果添加启动肥，建议启动肥的用量不超过0.5 kg/m³，以搭配以上奥绿的推荐用量。奥绿®草花型适合混施——不适合穴施。在某些情况下，可能需要改变水溶肥的方案和/或调整水质。如需获得专属建议或订制建议，请联系以化集团的特种肥料顾问。如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于生产条件千差万别，而且存在实际应用过程并非在我们管控等情况，以化集团不对任何不良后果负责。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。